

Requisitos para el día del estudio.

- Asistir 60 minutos antes de la hora programada.
- Presentar orden médica, historia clínica y los exámenes previos, relacionados con el área a evaluar (Antígeno de Próstata PSA, Resonancia Magnética de Próstata, biopsias previas).
- Presentar documento de identificación y carné, en caso que aplique.
- Asistir al servicio en compañía de un adulto responsable.

Instrucciones antes del estudio.

- Debe realizar una dieta líquida el día anterior al procedimiento: sopas licuadas, gelatinas. No tomar lácteos ni gaseosas.
- Tomar 1 tableta ciprofloxacina 500 mg cada 12 horas (en la mañana y la noche) iniciando 1 día antes del procedimiento y continuando por 2 días después de realizada la biopsia. En total tomar 6 tabletas de ciprofloxacina.
- Traer resultado de citoquímico de orina o urocultivo reciente (hasta de un mes).
- En caso de alergia o de resistencia a ciprofloxacina reportada en un urocultivo debe informarlo y traer Gentamicina 120 mg # 2 ampollas, las cuales se aplicarán en el servicio una hora antes del procedimiento.
- Llevar los resultados de los siguientes exámenes: TP, TPT, INR, recuento de plaquetas, con una realización menor a un mes. Si el paciente es anticoagulado debe contar con INR realizado en los 7 días previos a la fecha de la biopsia.
- Si consume ASA (Ácido Acetil Salicílico) debe suspenderlo 5 días antes del procedimiento.
- Si consume o se le aplican medicamentos anticoagulantes como: Clopidogrel (Plavix, Iscover), Warfarina (coumadin), suspenderlo 5 días antes del procedimiento. Debe ser avalada su suspensión por el médico tratante.
- Si se le está aplicando Heparina BPM suspenderlas 24 horas antes del procedimiento y reiniciar la noche después de la biopsia.
- Si recibe Heparina no fraccionada suspender 4 horas antes del procedimiento.

Instrucciones para el día del estudio.

- Tener 6 horas de ayuno, al momento de la realización de la biopsia, incluso si el paciente es diabético.
- Si el paciente usa insulina, el día del examen no se la debe aplicar.
- Colocar un Enema Travad **Rectal** la noche anterior al estudio y otro dos (2) horas antes del procedimiento (en total 2 enemas), retenerlo mínimo 10 minutos y luego evacuarlo. No aplicarlo si es menor a 8 años.
- El área de exploración no debe tener vendas, heridas o áreas infectadas.

Instrucciones después de la realización del estudio.

- Reposo absoluto (quietud completa) en cama por 2 horas y luego reposo relativo (movimiento libre sin esfuerzos físicos importantes) por 6 horas.
- Tomar medicamentos analgésicos y antiinflamatorios según prescripción médica.
- Reiniciar alimentación según condición del paciente y orden médica.
- En caso de: palidez, hipotermia, dolor abdominal o en el sitio de la biopsia, alteración del estado de conciencia, abultamiento y dolor, sudoración, mareo, desvanecimiento, fiebre, salida de material purulento, sangrado abundante por la zona intervenida o dificultad respiratoria debe consultar por urgencias.
- Se considera normal sangrado escaso con disminución en el tiempo y febrícula (temperatura entre 37.5 y 38 C) el primer día después de la biopsia. Si la fiebre persiste por más de 48 horas consultar a urgencias.
- Es frecuente el cambio de coloración en el semen el cual puede tomar un tono naranjado, esto se produce por pequeñas cantidades de sangre en las vesículas seminales. Este hallazgo puede durar hasta 1 mes.

