

Preparación para

Biopsia de Masa Intraabdominal
vía Percutánea

1

Requisitos para el día del estudio



Asistir **30 minutos** antes de la hora programada.



Presentar orden médica, historia clínica y los exámenes previos de la misma región a evaluar.



Presentar documento de identificación.



Debe asistir al servicio acompañado de un adulto responsable.



Si el paciente es menor de 5 años, debe asistir al servicio en compañía de dos adultos responsables.



Evite venir acompañado con menores de edad.



Informar al personal sobre historias de alergias a medicamentos, alimentos y/o medios de contraste; también informar si está embarazada o tiene sospecha de estarlo.



En los últimos 8 días no debe haber tenido estudios con medio de contraste baritado y en los últimos 3 días estudios con medio de contraste iodado.



Asistir al servicio en ropa cómoda, que no tenga ningún elemento metálico.



Te recomendamos no traer joyas, dinero ni objetos de valor.

2

Preparación para la realización del estudio



- Los menores de 2 años deben presentarse con 2 horas de ayuno.
- Si es un paciente menor de 12 años debe asistir con 4 horas de ayuno y los mayores de 13 años asistir con 6 horas de ayuno.



Si el paciente usa insulina, el día del examen no se la debe aplicar.



Suspender 48 horas antes todos los medicamentos homeopáticos como ginkgo biloba, ácidos grasos, omega 3, vitamina E o té verde.



Si toma o usa medicamentos como ácido acetil salicílico, aspirina, asawin, aspirineta, o anticoagulantes warfarina, coumadin, heparina, Pradaxa, Xarelto, Eliquis, Heparina, Dalteparina o Enoxaparina debe suspenderlos bajo la autorización de su médico tratante.



Debe traer los resultados de los siguientes exámenes de laboratorio: TP, TPT, INR, recuento de plaquetas, con una realización menor a un mes. Si el paciente es anticoagulado debe contar con un INR menor a 48 horas de realizado.

3

Cuidados posteriores a la realización del estudio



Reposo relativo el resto del día.



Tomar medicamentos analgésicos y antiinflamatorios según prescripción médica.



En caso de sangrado del sitio de incisión realizar compresión durante 15 minutos.



Reiniciar alimentación según condición del paciente y orden médica.



¡Contáctanos!



atencion.usuario@prodiagnostico.com.co



Asignación de citas: (604) 322 55 66



www.prodiagnostico.com